

**Homöopathisches Arzneimittel  
Flüssige Verdünnung zur Injektion  
Zur Anwendung bei Erwachsenen**

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss PRESSELIN-JEKT MAGEN jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach einigen Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt oder Heilpraktiker aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

**Diese Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was ist PRESSELIN-JEKT MAGEN und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von PRESSELIN-JEKT MAGEN beachten?
3. Wie ist PRESSELIN-JEKT MAGEN anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist PRESSELIN-JEKT MAGEN aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

**1. WAS IST PRESSELIN-JEKT MAGEN UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?**

PRESSELIN-JEKT MAGEN ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen der Verdauungsorgane.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Magenbeschwerden.

**2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON PRESSELIN-JEKT MAGEN BEACHTEN?****PRESSELIN-JEKT MAGEN darf nicht angewendet werden**

wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der arzneilich wirksamen Bestandteile oder den sonstigen Bestandteilen von PRESSELIN-JEKT MAGEN sind.

**Schwangerschaft und Stillzeit:**

Wegen des Bestandteils Colchicum nicht anwenden in Schwangerschaft und Stillzeit.

**Besondere Vorsicht bei der Anwendung von PRESSELIN-JEKT MAGEN ist erforderlich:**

Bei Beschwerden, die länger als eine Woche andauern oder periodisch wiederkehren, bei Schwarzfärbung des Stuhls sowie bei unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

**Kinder:**

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

**Bei Anwendung von PRESSELIN-JEKT MAGEN mit anderen Arzneimitteln:**

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Heilpraktiker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

**3. WIE IST PRESSELIN-JEKT MAGEN ANZUWENDEN?**

Wenden Sie PRESSELIN-JEKT MAGEN immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen der Arzt PRESSELIN-JEKT MAGEN nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da PRESSELIN-JEKT MAGEN sonst nicht richtig wirken kann!

Falls vom Arzt nicht anderes verordnet, wird als übliche Dosis in akuten Fällen täglich 1 Ampulle i.v., i.m., s.c. oder i.c. injiziert. Eine über 1 Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Arzt oder Heilpraktiker erfolgen. Bei chronischen Erkrankungen sollten wöchentlich 1 – 2 Ampullen i.v., i.m., s.c. oder i.c. injiziert werden.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

**Wie lange sollten Sie PRESSELIN-JEKT MAGEN anwenden?**

Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

**Wenn Sie eine größere Menge von PRESSELIN-JEKT MAGEN angewendet haben, als Sie sollten**

Wenn eine größere Menge des Arzneimittels angewendet wurde, als empfohlen, informieren Sie Ihren Arzt oder homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Dieser kann über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden.

**Wenn Sie die Anwendung von PRESSELIN-JEKT MAGEN vergessen haben**

Wenden Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

**Wenn Sie die Anwendung von PRESSELIN-JEKT MAGEN abbrechen**

Bevor Sie die Anwendung des Arzneimittels abbrechen oder wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder homöopathisch erfahrenen Therapeuten.

**4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Nebenwirkungen sind bei der Anwendung von PRESSELIN-JEKT MAGEN bisher nicht bekannt geworden.

Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

#### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen, wenden Sie an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte  
Abt. Pharmakovigilanz  
Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3  
D-53175 Bonn  
Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de)

anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### **5. WIE SIND PRESSELIN-JEKT MAGEN AUFZUBEWAHREN?**

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umlkarton und der Ampulle angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

#### **Aufbewahrungsbedingungen:**

In der Originalpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

### **6. WEITERE INFORMATIONEN**

#### **Was PRESSELIN-JEKT MAGEN enthält:**

1 Ampulle zu 1 ml enthält an arzneilich wirksamen Bestandteilen:  
Argentum nitricum Dil. D6 0,167 g  
Carbo vegetabilis Dil. D8 0,167 g  
Colchicum autumnale Dil. D6 0,167 g  
Semecarpus anacardium Dil. D8 0,167 g  
Strychnos nux-vomica Dil. D4 0,167 g  
gemeinsam potenziert über die letzten beiden Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.

Die sonstigen Bestandteile sind Natriumchlorid und Wasser für Injektionszwecke.

#### **Inhalt der Packung:**

10 Ampullen (N1) und 50 Ampullen (N2) mit je 1 ml flüssiger Verdünnung zur i.v., i.m., s.c. oder i.c. Injektion.

#### **Pharmazeutischer Unternehmer:**

Combustin pharmazeutische Präparate GmbH  
Offinger Str. 7  
88525 Hailtingen

#### **Hersteller:**

Dyckerhoff Pharma GmbH & Co. KG  
Robert-Perthel-Str. 49  
50739 Köln

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt im August 2018 überarbeitet.

Apothekenpflichtig  
Zul.-Nr. 6337254.00.00